DET SANSLÖSA VÅLDET

66

skolskjutningar

– alla använde antidepressiva

”9 av 10 av de mest våldsframkallande drogerna är psykiatriska droger.”





”Psykiatrins mediciner ligger bakom skolmassakrer”
– Psykiatriker David Healy

En informationsbroschyr från

Kommittén för Mänskliga Rättigheter – KMR

Den internationella övervakaren av psykiatrin

Psykiatrilagsutredningen har på uppdrag av regeringen överlämnat ett förslag om tvångsvård för psykiskt sjuka. Det handlar naturligtvis ytterst om att förebygga våld, mot sig själv och andra. På över tusen sidor har man lyckats med konststycket att undvika en av de absolut största anledningarna till det sanslösa våldet.
På bara en bråkdel av dessa sidor har KMR lyckats med konststycket att sammanfatta orsaken och bakgrunden till det våldet: den psykiatriska behandlingen med psykoaktiva droger.

DET SANSLÖSA VÅLDET

Om man skall diskutera orsaken till det sanslösa våldet måste man först titta på USA. USA:s befolkning utgör drygt en tjugondel av jordens befolkning men konsumerar två tredjedelar av alla psykiatriska droger. Anledningen till dessa siffror kan direkt kopplas samman till ökningen av diagnostisering av psykisk sjukdom. För utan diagnos kan inte psykiatriska droger skrivas ut. Men det finns en annan, långt mörkare sida: det ökande besinningslösa våldet. Lättillgängligheten till vapen är naturligtvis starkt *bidragande* till det extrema våldet, men absolut inte orsaken.

Det tycks råda större intresse i att ta reda på vilket vapen som användes vid skolskjutningarna än vilken psykiatrisk drog som användes. Om man letar efter fel orsak och försöker åtgärda den kommer situationen inte att förbättras, utan med stor sannolikhet försämras.

På bara 14 år, 1998-2012, har det förekommit 66 fall av skolvåld med vapen och psykiatriska droger dokumenterat inblandade i USA. Vi har bara hört talas om en del av dessa, de mest spektakulära. Och de blir allt värre och allt fler. En webbsida räknar upp över 4800 fall, inklusive dessa 66, där besinningslöst våld och antidepressiva SSRI-medel kopplats samman, länkat till tidningsartiklar som beskriver våldet.
http://ssristories.com/index.php?p=school

”Man kan dra en linje mellan antalet skolpsykiatriker i USA och antalet skolskjutningar, och man kommer att finna att båda gått upp i samma riktning under samma tid,” menar Healy som varnar för att utöka psykiatrins insatser. ”Det kommer att leda till mer skolvåld, oavsett om man försöker få bort skjutvapnen.”
Video: http://www.wnd.com/2013/01/top-psychiatrist-meds-behind-school-massacres/#jEX94DZ8POVsuC4A.99London-basedideo:
En annan webbsida räknar upp en tidslinje av masskutningar av olika slag som begåtts under inflytande av psykdroger, för sig eller i kombination. http://mass-shootings.com/timeline/


Barn drogas ner
Barn och ungdomar i USA, såväl som i övriga världen, är måltavla för den psykiatriska mångmiljardindustrin och får mycket kraftiga psykiatriska droger i en aldrig sinande ström. Även om siffrorna är osäkra, visar en studie att 10,4 miljoner barn och ungdomar i USA hade en ADHD-diagnos (2010) och många av dessa med största säkerhet får någon form av psykiatrisk drog. Det är långt mer än hela Sveriges befolkning, bara i ett enda land. 11 procent av USA:s befolkning över 12 år (10 procent över 6 år) tar minst ett antidepressivt medel, nio av tio barn som besöker en psykiatriker kommer ut med recept på en personlighetsförändrande drog.
http://www.huffingtonpost.com/2012/03/21/adhd-diagnoses-up-by-66-perent_n_1370793.html?ref=mostpopular

Och våldet bara ökar.
Det sanslösa våldet började när det första neuroleptikapreparaten lanserades 1955 (Thorazin/Hibernal), vilket betraktades som en revolution inom psykiatrin och jämfördes med penicillinet inom medicinen. Bisarra våldsdåd började dock inträffa ett kort tag efter denna revolution.
Våldet tog ordentlig fart när SSRI-antidepressiva kom i USA, i mitten på 1980-talet, främst Prozac.
Under 1990-talet exploderade skolskjutningarna när också skolbarnen började få psykdroger. Innan dess kan man knappast hitta något liknande besinningslöst våld. Men det fanns dock vapen, gott om dem. Och detta är absolut inget försvar för vapen, vi vill betona det, men de psykiatriska drogerna var och är detonatorn.

”Man kan dra en linje mellan antalet skolpsykiatriker i USA och antalet skolskjutningar, och man kommer att finna att båda gått upp i samma riktning under samma tid.”
– Psykiatriker David Healy



Detta är bara ett ”modernt problem” som sträcker sig några decennier tillbaka. Före 1960 var dessa problem så gott som obefintliga. Och detta är ett mycket viktigt konstaterande. Psykdrogerna lanserades i mitten av 1950-talet. Författaren Colin Wilson har forskat åtskilligt i bakgrunden till våldsbrott. I sin bok *”The Encyclopedia of Modern Murder”* skriver han:



Före 1950-talet förekom knappast vansinnesdåd. Det var då de psykiatriska drogerna släptes loss i samhället – och det sanslösa våldet. (Statistiken för psykofarmaka är schematiskt framställd.)

Tio-i-topp av de mest våldsframkallande drogerna

Nio av tio-i-topp av de 31 mest våldsframkallande drogerna är psykiatriska droger. Den inledande siffran anger rangordning bland de som orsakar mest våld. Det efterföljande namnet är det generiskt verksamma ämnet. Inom parantesen anges varumärket engelskt/svenskt. Därefter vilken typ av medicin det är och till sist hur många gånger det ökar våldsbenägenheten (ex. 7,9 x – gånger).

10. Desvenlafaxin (Pristiq) Antidepressiv. **7.9 x**
9. Venlafaxin (Effexor) Ångestdämpande. **8.3 x**
8. Fluvoxamin (Luvox) Antidepressiv. **8.4 x**
7. Triazolam (Halcion) Bensodiazepin. **8.7 x**
6) Atomoxetin (Strattera) ADHD-medicin. **9 x**
5) Mefoquin (Lariam) Malariamedicin. **9.5 x**
4) Amfetaminer: (olika) ADHD-medicin. **9,6 x**
3) Paroxetin (Paxil/Seroxat) Antidepressiv. **10.3 x**
2) Fluoxetin (Prozac/Fontex) Antidepressiv. **10.9 x**
1) Vareniclin (Chantix/Champix) Antirökmedel. **18 x**

”Vi kallar ett brott vansinnesdåd om det inte verkar göra någon nytta för någon. Före 1960 så var sådana brott sällsynta, och de få som inträffade skedde i slutet av det årtiondet.”

Psykdrogerna toppar våldslistan

En studie som publicerades i PloS One år 2011, och presenterades i Time, identifierade 31 droger som mer än andra kopplades till rapporter om våld. **Bland de tio i topp var nio psykiatriska droger, antidepressiva, ADHD-amfetamin eller antipsykotiska medel.** Prozac kom som nummer två och Paxil/Seroxat som god trea. Nummer ett var rökavvänjningsmedlet Chantix/Champix, som i sig är ett omarbetat antidepressivt medel. Den enda egentlige icke-psykiatriska drogen var ett malariamedel. Och då hade man gått igenom alla tänkbara våldsframkallande droger som fanns. Mer behöver knappast sägas, men psykiatri är ju ekonomi och politik, så absolut inget hände efter publicerandet.
http://healthland.time.com/2011/01/07/top-ten-legal-drugs-linked-to-violence/#ixzz1AN3bAwAe
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0015337

Syftet var maximal beteendestörning

Det *uttalade* syftet med de psykiatriska drogerna var från början ”maximal beteendestörning” (Thorazine/Hibernal). Och när man läser vidare i texten är man benägen att hålla med. Varför kallar vi det då psykdroger? De påverkar transmittorämnen på liknande sätt som LSD, kokain och andra droger och förvränger perceptionerna – en kemisk förvrängning av det mentala tillståndet. Där LSD, som också påverkar serotoninhalten, ger hallucinationer, kan SSRI-medlen ge vanföreställningar. Verkligheten bågnar! Det är på något sätt som man kapslar in personen, kemiskt sett, och till slut exploderar vissa. De förändrar personligheten, och det ruskiga är att många säger att de aldrig hittar tillbaka till sig själva. De är också beroendeframkallande. De är absolut inte ”mediciner”. De ger abstinens. De botar inget. Därför är de droger.

Personer som påstår att de mår bättre av psykdroger upplever samma fenomen som när man tar alkohol eller annan mildare drog, obehagliga problem och känslor stängs av och man kan eventuellt känna sig bättre – ett tag. Aldrig i längden. När det gäller antipsykotika är det samma som en kemisk lobotomi, de skär av nervbanorna – och känslorna – kemiskt. Det är alltså möjligt att ett fåtal kan *känna* sig bättre, men de *är* inte bättre, det är helt enkelt en hjärndysfunktion, en kemisk manipulation av psyket, av hjärnfunktionen. Folk som har psykiska problem behöver hela sin mentala kapacitet intakt.
http://www.huffingtonpost.com/dr-peter-breggin/medication-madness-how-ps_b_223922.html

Kurt Danysh var 18 år när han sköt ihjäl sin pappa. Till polisen sa han:


”Jag använde Prozac … det förväntades lugna ner mig, men sedan jag började med det så var det något som oroade mig, det oroade mig extremt … Jag agerade helt annorlunda … jag tillbringade halva tiden i trans. Jag insåg inte att jag gjort det [skjutit] förrän efteråt, och då fattade jag. Det låter kanske underligt, men det kän-

des som någon annan, som om jag inte hade kontroll över vad jag gjorde; som om jag lämnades där hållande en pistol. Det kändes som om någon annan sköt honom."
Kurt Danysh hade varit 17 dagar på Prozac och aldrig haft några våldsutbrott innan. Efter skottet gjorde han en vansinneskörning med sin bil och kraschade den mot en mur. Ett tag innan mordet hade han även slagit sin flickvän, vilket aldrig hänt förut.
http://www.thesaveproject.com/

Mammor som mördar sina barn

Helena, 5 år, i Bergsjön i Göteborg, blev strypt och skändad av sin mamma. Efter ett stort pådrag efter mördarna riktades misstankarna mot modern som erkände dådet. Vad som framkom senare var att hela familjen; modern och de tre barnen, samtliga fick psykiatriska droger. Modern erkände att drogerna släppt på spärrarna.

Andrea Yates familjemedlemmar grät i rättssalen när hennes 73-åriga mor, Karin Kennedy, bad juryn att skona Andreas liv. Kort därefter dömdes Andrea till livstids fängelse för att hon dränkt alla sina fem barn i ett badkar – ett efter ett. Detta fall har upprört hela USA och spaltkilometrar har skrivits om hur och varför Andrea Yates den 20 juni 2001 dränkte alla sin fem barn i hemmets badkar. Barnen var 7, 5, 3, 2 och sex månader gamla.
KMR:s ordförande i delstaten Texas, Jerry Boswell, gick igenom rättegångsprotokollet och noterade att Andrea Yates fått psykiatrisk behandling flera år innan morden – och att hon inte varit våldsam innan detta, även om hon haft psykiska problem.
Boswell fann till exempel att psykiatrikern ett par dagar innan morden hade satt ut medicinen Haldol – efter det att han fördubblat dosen. Men inte bara det. I en radiointervju berättade Boswell att psykiatrikern även gett Andrea Yates den antidepressiva medicinen Effexor, och att han bara någon månad innan morden, skruvat upp dosen från 250 mg till 450 milligram per dag.





Ett mycket uppmärksammat fall i USA var Susan som spände fast båda sina barn, 3 år och 14 månader, i bilen och körde ner den i sjön – och ställde sig att titta på. Hon hade fått en cocktail av psykiatriska droger innan.

Psykiatrin är orsak och inte en kur för massvåld, och att söka efter hjälp från psykiatrin kommer enbart att distrahera oss från att söka genuint effektiva lösningar."
– Psykiatriker Peter Breggin



Andrea Yates dömdes till livstids fängelse för att hon dränkt alla sina fem barn i ett badkar – ett efter ett. Hon hade fått en cocktail av mycket starka psykiatriska droger innan.

"Den så kallade terapeutiska dosen ligger på 37,5 mg," sade Boswell i radion. " Andrea Yates fick inte behandling – hon blev bedragen!"

Lisa Brown dränkte sitt sju månader gamla barn på julafton och berättade för polisen att hon börjat ta Paxil/Seroxat och kände sig som hon gick på metamfetamin.

Det har även förekommit att äldre människor blivit våldsamma.

- En 70-årig man i Göteborg rusade mitt i natten in till sin inneboende och började hacka på honom med hammare och kniv, samtidigt som han skrek, "Nu skall jag döda dig din jävel!" Han hade börjat ta antidepressiva medel men aldrig varit våldsam förut.
- Den respekterade äldre polischefen som började använda antidepressiva medel och kort tag därefter sköt ihjäl hela sin familj, inklusive sig själv.
- Den pensionerade oljearbetaren Donald Schnell som sköt ihjäl sin hustru, dotter och barnbarn och sedan sig själv hade använt Paxil/Seroxat i bara två dagar och hade inga som helst våldstendenser innan. Domaren lade 80 procent av skulden på tillverkaren av drogen. (Washington Posts specialtidning *Insight* juli 2001). GlaxoSmithKline (GSK) fick betala 6,4 miljoner dollar till Donald Schnells överlevande. Han hade aldrig varit våldsam förut.
- Tre män i 70-80-årsålder attackerade sina fruar med hammare under inverkan av psykofarmaka. En äldre kvinna med syrgastub och inget kriminellt förflutet rånade en bank. En äldre kvinna från Oklahoma tackar ja till en kopp te från en kvinna hon just mött – och dödar henne. En äldre man dödar sin fru och tre barn. En annan dödar sina två systrar under ett födelsedagsparty. Alla använde antidepressiva.

Det finns mängder av liknande fall. Sådant läste man aldrig om förr i tiden. Vad är den gemensamma faktorn? Alla hade fått psykiatriska droger.

Ett av de mest sålda antidepressiva medlen är Paxil/Seroxat. Det är också ett av de mest våldsframkallande. Några av de uppgivna biverkningarna är:

> **Mani, sömnsvårigheter, ångest, upprördhet, förvirring, minnesförlust, paranoida reaktioner, psykos, fientlighet, delirium, hallucinationer, abnormt tänkande, avpersonalisering, brist på känslor, m.m.**

Och även om ”bara” en på 1000 får ett psykotiskt sammanbrott så räcker det för att tiotusentals människor skall råka ut för det.

Skolskjutningar

Vi har även sett en hel del skolskjutningar där ungdomar först skjutit ihjäl sina föräldrar. **Alla var på antidepressiva, antipsykotika och/eller ADHD-droger.**

- Kip Kinkel, 15 år, sköt sin föräldrar i sömnen och gick sedan till skolan och sköt sedan ihjäl två och skadade 22 andra. Han hade just börjat med Prozac och använde Ritalina.
- Christopher Pittman var 12 år när han mördade bägge sina morföräldrar och brände ner huset. Han tog Paxil/Seroxat och sedan Zoloft.
- Jarred Viktor var 15 år när han högg ihjäl sin mormor med 61 knivhugg efter bara fem dagar på Paxil/Seroxat.
- Chris Fetters, 13 år, dödade sin favoritmoster efter han börjat med Prozac.
- Jeff Weise, 18 år, dödade bägge sina morföräldrar, gick till skolan och sköt ihjäl sju personer och skadade sju. Därefter sköt han sig själv. Han använde Prozac.
- Det är inte bara män som blir psykotiska. Den 20 maj 1988 gick Laurice Dann in i en skola i Winnetka, Illinois och började skjuta oskyldiga barn. Hon dödade en och skadade fem andra innan hon sköt sig själv. Vid obduceringen fann man spår av psykiatriska droger.

Vi har en av de värsta skolskjutningarna, den 14 december 2012, där Adam Lanza, 20 år, först sköt ihjäl sin mamma och sedan 20 små barn och sex lärare. Det är i skrivande stund inte fastställt om han använde psykdroger, men enligt Washington Post så hade anhöriga berättat att han fick medicinering när han var yngre. CNN:s välkände medicinreporter, neurokirurgen Sanjay Gupta, uttalade sig 18 december 2012 i CNN om Adam Lanza:

> ”Vi vet fortfarande inte mycket om skytten som bodde i sitt hem. Men det är något annat man bör ta hänsyn till: Vilken medicinering, om någon, gick han på? Jag talar specifikt om antidepressiva. Om man tittar på undersökningarna från andra skolskjutningar som har hänt, så var medicinering en gemensam faktor … När någon påbörjar dessa medicineringar och när någon upphör så kan det leda till ökad impulsivitet och minskat omdöme ... Det är värt att peka ut att över en sjuårsperiod så finns det 11 000 våldsepisoder relaterade till biverkningar från mediciner.”
>
> Video: http://www.cchrint.org/2013/01/14/psychiatricdrugs-schoolshootings/

Eller som *Washington Posts* specialtidning *Insight-magasine* skrev i sin artikel ”Guns and Doses” i juninumret 1999 efter Columbinemassakern:

> ”Även om många amerikaner upprörts över det bisarra skjutandet på skolorna, är det få som uppmärksammat hur många av dem som skjutit som finns bland de sex miljoner barn som nu får psykofarmaka ... ***Vi har en mardröm framför oss med de här psykiatriska drogerna. Vi har unga människor som är som tidsinställda bomber som tickar i skolorna.”***

Övriga uppmärksammade skolskjutningar:

- Cho Seung-Hui sköt ihjäl 32 personer på en skola i Virginia, USA år 2007. Han använde antidepressiva och hade fått psykiatrisk behandling sedan 2005. Detta är den värsta skolskjutningen någonsin.
- 1999 sköt och skadade T J Solomon sex av sina skolkamrater. Han använde Ritalina.
- 1999 sköt Eric Harris tolv elever och en lärare på Columbine high school. Han använde Luvox – ett antidepressivt preparat. Enligt den psykiatriker som vittnade i rätten hade Harris använt Luvox i ett år, och under de sista två-tre månaderna höjt dosen till hela 200 mg och uppvisade drogframkallade skakningar fem veckor innan skolskjutningen. Hans blogginlägg visade också en ökande aggression.
- Colorado-skjutningen i en bio under premiären på Batman begicks av James Holmes, som varit under långvarig psykiatrisk behandling. Han tog 100 mg Vicodin innan han gick till bion och sköt ihjäl 12 personer och skadesköt 70.

Den första skolskjutningen utfördes av ”Texas Tower mördaren” Charles Joseph Whitman som 1966, förskansad i ett torn på universitetet i Austin, sköt ihjäl 16 människor och sårade 32. Dessförinnan hade han knivmördat sin fru och sin mor. Man letade efter förklaringar i form av arbetslöshet och andra sociala faktorer men glömde den viktigaste faktorn. Whitman hade fått psykiatrisk behandling innan. Han var dock inte våldsbenägen före detta. När han blev skjuten i tornet fann man ”några piller” i hans ficka som visade sig vara Dexedrin, det första av psykiatrins massproducerade droger. Dexedrin är nära besläktat med metamfetamin, vilket kan orsaka psykos och huvudvärk, vilket Whitman klagade över i sitt självmordsbrev som visade tydliga tecken på psykos. Man skyllde på att Whitman hade en liten hjärntumör, men en patolog hävdade bestämt att den varken kunde orsaka huvudvärken eller hans bisarra beteende. Mycket få media nämner de psykiatriska drogerna som orsak, eller överhuvudtaget.
http://psychiatricnews.wordpress.com/the-texas-tower-massacre/

Depression orsakar inte våld

Om man är försiktig kan man ju spekulera i om de psykiatriska drogerna kanske inte är tillräckligt effektiva, eller om personerna

får tillräckligt med droger. Men frågan uppstår dock: framkallar de i själva verket våld? Och det vet vi att de gör. Depression i sig orsakar inte våldsamt beteende. Antidepressiva gör det. Och det är inte bara KMR som säger detta. Det står till och med på bipacksedlarna till många av preparaten, och allt fler läkare och forskare instämmer i detta.
http://www.aftonbladet.se/debatt/article1936627.ab

En av våra mest våldsframkallande droger är amfetamin och amfetaminliknande preparat för ADHD, såsom Ritalina och Concerta. Detta ger man 50 000 vuxna och barn i Sverige. Ett flertal mycket ruskiga våldsdåd har inträffat med dessa medel.

- Jeanette Javell som mördade sin sovande pojkvän med 30 knivhugg gick på ADHD-drogen Concerta. ”Medicinen gjorde mig till mördare”, skrev hon i ett brev till Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16033275.ab
- Vi har en av de ruskigaste våldtäkter som begåtts. En 33-årig man hade våldtagit två 17-åriga flickor under en bilfärd som pågick i 16 timmar. Enligt åklagaren var det det värsta våldtäktsfall hon sett. Han använde Concerta och antidepressiva.
- Skarakannibalen skar huvudet av sin flickvän, våldtog och åt av kroppen. Han hade använt Concerta i flera år. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16036890.ab

Amfetamin och kokain identiska

För över 30 år sedan fastställde WHO att kokain och amfetamin/Ritalina är farmakologiskt identiska och placerade därmed Ritalina i Schedule II-klass, samma som kokain, morfin, opium och metadon. Detta är klassen med högsta beroendeframkallande vid medicinskt bruk.

WHO fastställer även att det är knappt möjligt att skilja på kokain och Ritalina/amfetamin vid användning då de påverkar samma receptorer i hjärnan. 1995 gjorde även DEA (Drug Enforcement Agency) en jämförelse:

> ”Det är uppenbart att Ritalina ersätter kokain och amfetamin i ett antal beteendemönster (behaviour paradigms).”

I tidskriften Archives of General Psychiatry 2005 kunde man läsa:

> ”Kokain är en av de mest kraftiga och beroendeframkallande av alla droger och har en farmakologisk verkan mycket snarlik den hos Ritalina.”


http://www.kmr.nu/pressrel_2012_09_15-undersokningar-visar-att-ritalina-conerta-ar-starkare-an-kokain-och-kan-skada-hjarnan.htm

Militärer på psykdroger i USA orsakade sanslöst våld

Krig är våld, men det har uppstått ett annat sanslöst våld inom kriget som inte upplevdes på samma sätt som innan psykiatrin anlitades av militären i den grad som nu görs.

- Aaron Alexis sköt ihjäl 12 på en militärbas i Washington i år.
- Massakern på 16 civila i Afghanistan utförd av en amerikansk soldat våren 2012 hade något gemensamt med så gott som






Skolskjutningen i Newstown i december 2012 där Adam Lanza sköt ihjäl sammanlagt 28, varav 20 barn.



Kip Kinkle, 15 år, 4 döda, 22 skadade



Jeff Weise, 17 år , 10 döda



James Holm, 12 döda, 70 skadade











9 skolskjutare - alla på psykdroger- 119 döda - hundratals skadade

varje enstaka skolskjutning i USA – psykiatrisk behandling med psykofarmaka.
• 2011 arresterades tolv soldater för att ha format ett ”mördarteam” som slumpmässigt sköt och bombarderade civila.
• En sergeant hade plötsligt öppnat eld mot civila bönder utan anledning december 2011.
• En annan soldat hyllades som hjälte efter att ha räddat sina kamrater under en självmordsbombning. Nu sitter han fängslad de nästkommande 52 åren för mordförsök. Han fick sammanlagt nio olika psykdroger.
• Kenny Eastbridge talar ut i fängelset efter en dom för mordförsök och andra brott. Han fick en cocktail av psykdroger: ”Jag fick ett totalt mentalt sammanbrott. Varje dag var jag i krig utan uppehåll. Det var helt galet. De satte mig på alla möjliga slags mediciner och jag var fortfarande ute på uppdrag. De gav mig Ambien, Remeron, Lexapro, Celexa, alla möjliga saker.” Eastbridge rapporterades ha uppträtt mycket egendomligt, bland annat gick han in i hemmen i Irak, la sig i människors sängar och försökte krama lokala invånare. Detta skedde innan aggressionerna började.

Fler soldater dog av självmord än från kriget januari 2012. Under juli månad 2011 förekom det 32 självmord, 21 bland aktiva trupper och 10 bland reserverna, I en rapport visar det sig att 36 procent av alla som begår självmord inte varit i aktiv tjänst. Man kan därför inte skylla på stridsutmattning och PTSD var heller inte en faktor. Detta är viktigt. De psykiatriska drogerna var den utlösande faktorn.
http://www.theepochtimes.com/n2/health/prescription-drugs-are-often-behind-mass-shootings-327408.html

Psykiatrin i armén bara öser ut psykdroger. Aldrig förr har så mycket skrivits ut. På bara några år hade 73 103 recept på Zoloft skrivits ut, 38 199 för Prozac, 17 830 för Paxil/Seroxat, och 12 047 för Cymbalta. Alla dessa har en varning för självmord på etiketten. 4994 soldater på Fort Braggs fick antidepressiva, 664 antipsykotika och många soldater tar mer än en psykdrog.
Över 300 soldater har dött i sömnen. Två soldater fick sammanlagt 54 olika psykiatriska droger under ett år. Bägge avled i sömnen. En annan soldat som dog i sömnen hade 30 pillerburkar i hemmet.
Överste Bart Billings, en tidigare armépsykolog, var rättfram när han vittnade inför Kongressen:
”Jag känner rakt av att psykiatrikerna är direkt ansvariga för dödsfall inom militären”, och i en senare artikel: ”Jag anser att det är kriminellt vad de gör”.
De mixas även då soldaterna bjuder varandra på, eller byter, droger. Cocktailen kan vara förödande. Ingen vet vad som händer när man blandar flera olika sorter. Inga studier har gjorts. Man har dock märkt ”försämrad reaktionsförmåga, ökad självmordsbenägenhet, aggression och fientlighet”.

”Föreställ er att framkalla detta bland män och kvinnor som är kraftigt beväpnade och under stress”, sade psykiatriker Peter Breggin som anlitats av armén som expert. Han är starkt kritisk mot den massiva nerdrogningen inom armén.
”Det finns inga [psykiatriska] droger som *förbättrar* hjärnans funktion, de *förändrar* hjärnans kemiska balans och kan ha samma effekt som gatudroger,” sade Breggin under en hearing vid Veterans Affair år 2010.
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressrelease/view/fler-soldater-doer-av-sjaelvmord-aen-fraan-kriget-men-vad-aer-orsaken-794119

FBI prioriterade besinningslöst våld
Redan 1983 så bedömde FBI i USA att 5000 offer - i genomsnitt 13 varje dag - dödades på grund av det besinningslösa våldet. I juni 1989 hade situationen blivit så allvarlig att chefen för FBI beordrade att sanslöst våld skulle prioriteras inom byrån.

Besinngslöst våld i Sverige och andra europeiska länder
Det är naturligtvis inte bara i USA detta händer. Två skolskjutningar har skett i Finland med 17 dödsfall förutom alla skadade, och en chockad nation. Bägge förövarna hade varit på antidepressiva före dåden. I den första hade Pekka-Eric Auvinen, som dödade åtta i en skola, själv publicerat ett meddelande på internet att han blev aggressiv av de antidepressiva medel han tog.

Det har förekommit i Belgien, Tyskland och andra länder. Det har varit en mängd sanslöst våld i Schweiz senaste årtiondet. Minst 15 sanslösa våldshändelser har skapat rubriker. Antidepressiva är den mest utskrivna medicinen av alla och har fördubblats de senaste tio åren. I januari 2013 sköt en 33-årig man i Daillon ihjäl tre kvinnor och skadade två män som han inte kände. Han hade fått långvarig psykiatrisk behandling. Något som uppenbarligen inte var till nytta. Bussföraren som körde ihjäl 22 skolbarn år 2012 gick på antidepressiva. 2008 mördade en respektabel läkare sin fru. Försvaret gick ut på att bevisa att den antidepressiva han tagit innan mordet orsakade våldet. Under rubriken ”Molekylen som gör dig galen” gjorde Radio Television Suisse förra året en exposé över det drogframkallade våldet: video (franska):
http://www.rts.ch/emissions/temps-present/sante/3736891-la-molecule-qui-rend-fou.html

Vi har förskonats från skolskjutningar i Sverige, men inte det besinningslösa våldet. Vansinneskörningen i Gamla stan, Samuraijmannen, som högg örat av en kvinna, järnspettsmannen, mordet på femåriga Sabine, samma dag som Anna Lindh dog, är några. Vi har tyska Christine som behandlats inom psykiatrin under lägre tid och tagit en hel del psykdroger strax innan hon dödade de bägge barnen i Arboga och mannen som knivhögg 16-åriga Norba i Södertälje och tvångsinjicerats dagen innan, är andra kända händelser,

det finns många, många fler:

- Vi har den mycket populäre skolbusschaufförен från Värmland som backade på en bil med norrmän på en väg mitt ute i skogen – fyra gånger. Därefter tände han eld på deras bil. Sedan hotade han dem med en pistol – som han inte hade. En av männen flydde ut i skogen och bröt benet. Chauffören som använt psykdroger och aldrig varit våldsam förut kom inte ihåg någonting av händelsen. Därefter stod han åtalad, lika förvånad och chockad som norrmännen.
- Vi har tvåbarnspappan som anhölls och låstes in på rättspsyk. Han fick ett antidepressivt medel och blev plötsligt ”besatt av Filippa Reinfeldt” kunde man läsa i kvällstidningarna. Han hade dessförinnan fått ett fullständigt sammanbrott och sov inte mer än två-tre timmar per dygn. ”Jag var i bedrövligt skick och yrade om att mörda någon”, sade mannen i förhören. Polisen kom och hämtade honom och han blev pressad att säga vem han skulle mörda. ”Då klämmer jag ur mig Filippa Reinfeldt, av alla människor. Jag har aldrig tänkt på henne förut i hela mitt liv”, berättade han. Han släpades därefter till rättspsyk där han förhörs om sina ”mordplaner” av tio personer. Dagen efter kommer Säpo och förhör honom. ”Äntligen får jag träffa några vettiga människor och i lugn och ro berätta vad som hänt.” Några dagar senare släpps han. Säpo hade förstått att det var medicineringen som ställt till det.
- Anna Lindhs mördare, Mijailo Mijailovic, berättade för en medfånge som fått bra kontakt med honom att han inte hade planerat att döda Anna Lindh, att det var psykdrogerna som var orsaken. Han sade att han ”åt för mycket Rohypnol och visste inte vad han gjorde.” (AB 2008-04-06) Han lär ha haft recept på 15 olika psykdroger när polisen grep honom.

Alla blir naturligtvis inte våldsamma på psykdroger, men tillräckligt många för att skapa ständiga rubriker. Andrea Yates som dränkte sina fem barn gick på Effexor. Tillverkaren Wyeth har lagt till ”mordtankar” (homocide ideation) på listan av biverkningar. Visserligen råkar bara 1 på 1000 ut för detta, men när man betänker att omkring 20 miljoner recept skrivits ut varje år förstår man att många tusen (statistiskt sett 20 000) går omkring med mordtankar. Det räcker för att skapa löpsedlar varje dag året runt.
Eric Harris som sköt ihjäl 12 elever och sårade 24 andra innan han och Klebold sköt sig själva hade använt Luvox. Tillverkaren Solvay uppger att 4 procent av användarna utvecklar mani – vilket visar sig som extrem upphetsning och villfarelse. Vi kan föreställa oss att lika många går omkring i detta tillstånd.
http://www.wnd.com/2007/07/42434/

Bekräftande undersökningar
Det är många undersökningar som bekräftar att personer kan bli våldsamma efter psykiatrisk behandling. En av dem har utförts av professorn i rättspsykiatri vid Umeå universitet, Gunnar Kullgren. Han studerade behandling och resultat hos alla som genomgått rättspsykiatrisk undersökning åren 1988-1995. Totalt rörde det sig om 4000 personer. Han fann att närmare hälften av dem som hade dömts till rättspsykiatrisk vård för våld hade återfallit i våldsbrott inom fyra år efter utskrivning. Kullgren tror även att det finns ett mörkertal, då alla brott inte leder till åtal eller fällande domar. Siffran kan alltså vara långt högre.

50 procent blev kriminella
Vid en annan undersökning, som leddes av professor Per-Anders Rydelius vid Karolinska Institutet och som presenterades ungefär samtidigt som Kullgrens, fann man att varannan psykvårdad pojke blivit kriminell. Över hälften av de pojkar som under sin uppväxt haft kontakt med barnpsykiatrin blev senare i livet kriminella. Man undersökte sammanlagt 1450 ungdomar. 52 procent av de pojkar och 21 procent av flickorna som haft kontakt med psykiatrin som barn återfanns senare i kriminalregistret. De hade dömts till i genomsnitt fyra brott per person, varav misshandel, narkotikabrott och stöld tillhörde de vanligaste. Totalt begick denna grupp 2066 brott.

70 procent begick brott
Rättsmedicinalverket i Sverige gjorde i slutet av 1990-talet en undersökning på 1000 personer som genomgått rättspsykiatrisk undersökning. I stort sett samtliga var skyldiga till grova våldsbrott. Det visade sig att varannan person som begått grova våldsbrott varit i kontakt med psykiatrin en kort tid innan de begått brottet. I vissa fall hade brottslingen varit i kontakt med psykiatrin dagen innan brottet men sällan mer än tre månader. Lägger man till behandlingar för missbrukare ökar siffrorna till två av tre, alltså cirka 70 procent.

70 procent begick nya brott
Den senare siffran bekräftas av en undersökning som Anders Tengström, doktorand på Karolinska institutet, gjort för Dagens Nyheters räkning. Undersökningen som uppmärksammades i DN den 29 september 1999 visar att sju av tio, 70 procent, av patienterna som vårdats inom rättspsykiatrin begått nya brott inom fem år efter utskrivningen, närmare 40 procent begick våldsbrott.

Begick brott tre dagar efter
En annan undersökning som utfördes av Gunnar Holmberg, överdirektör vid Rättsmedicinalverket, visar att 61 procent av dem som dömts till rättspsykiatrisk vård besökt psykiatrin innan brottet. Holmbergs undersökning omfattade 268 brottslingar som genomgick rättspsykiatrisk undersökning under ett år i mitten av 1990-talet. Vissa begick brottet tre dagar efter kontakt med psykiatrin.

Det finns oerhört många exempel på vansinnesdåd efter användning av psykdroger. Psykiatrikerna hävdar dock fortfarande att det skulle vara den ”underliggande psykiska sjukdomen” som gör att personerna blir våldsamma - men så är nästan aldrig fallet - det är

de psykiatriska drogerna som är orsaken. Den absoluta majoriteten hade inte varit våldsamma före kontakten med psykiatrin.

- En ung kvinna från Varberg blev slaktad till döds av sin släkting med 29 svärdshugg. Mannen hade fått psykdroger i flera år.
- Pia måste gömma sig för sin exmake som försökt döda henne och hennes tre barn med en djungelkniv. Mannen har fått psykiatrisk behandling.
- En 23-årig man försökte döda en 46-årig kvinna mitt i centrala Kungälv. Hon stod och tittade i ett skyltfönster när mannen kom fram och hälsade. Hon hälsade tillbaka och fortsatte att titta i skyltfönstret. Mannen högg henne då tre gånger i ryggen. Han hade permission från psyket.
- I Borås högg en man ett barn i huvudet med en yxa. Barnet kände inte mannen utan stod och tittade i ett skyltfönster. Mannen hade fått psykiatrisk behandling.
- Ett annat exempel är en man som blev utsläppt från ett mentalsjukhus och gick direkt och köpte en jaktkniv med vilken han knivhögg sin 9-åriga dotter till döds. Han ville hämnas sina psykiatriker som gav honom antipsykotika och som orsakade honom ”smärta”.
- Vi har historien med kvinnan som dödade sin mor med en trädgårdssax och slog ihjäl sin far med ett trubbigt föremål. Hon trodde att hon skulle bli en normal person när hon dödat sina föräldrar. Dagen innan hon dödade sina föräldrar hade hon injicerats med neuroleptika och fått samma drog i pillerform.
- En man i Göteborg slänger ut sin 4-årige son från balkongen på tredje våningen och jagas naken i två timmar genom centrala stan.
- En annan man knivskär sig själv upprepade gånger och berättar senare att han ”kunde inte ens känna kniven när han högg sig själv”.

Våldsdrogen Rohypnol

- Sex personer i en kyrkokör i Uppsala, varav en i rullstol, misshandlades och hölls som gisslan av tre unga pojkar som var påverkade av Rohypnol.

En publicerad forskningsrapport från Karolinska Institutet från 1999 visar att ungdomar använde Rohypnol för att de vill begå brott. De vill bli aggressivare. Forskaren, fil. dr Anna Dåderman på Karolinska Institutet, som gjort undersökningen säger:
”De ungdomar jag intervjuat säger att de tar Rohypnol för att de vill begå våldsbrott. För att de vill slippa vara rädda. Det handlar inte om att aggressiviteten är en biprodukt av ruset. Det handlar om att ungdomarna eftersträvar aggressiviteten.”
KMR intervjuade Anna Dåderman på Karolinska Institutet samma år. Detaljerna som kommit fram under dessa intervjuer är ruskiga. Men de är också intressanta ur den aspekten att detta ger en förklaring till det oförklarliga råa våldet.
”Några av de intervjuade sade att det var lättare att mörda. Det var som att skära i smör. Efteråt drabbas de ofta av minnesluckor, så att de inte behöver komma ihåg vad de har gjort.”
Anna Dåderman berättade att alla förövarna hon intervjuat hade bett att hon skulle hjälpa till att få bort Rohypnol från marknaden. I sin ursprungliga avhandling hade hon tagit med detta. Flera forskare och professorer hade då sagt till henne att ta bort detta, då det ansågs ”oseriöst”. Anna Dåderman berättade att hon efteråt ångrade detta djupt, men skulle ta upp det igen vid senare tillfälle.

KMR skrev till Socialstyrelsen efter detta och krävde att Rohypnol skulle dras in. ”Det är mycket bra, vi önskar fler gjorde så,” svarade en tjänsteman som slussade ärendet vidare, vilket till slut resulterade i ett säljstopp för Rohypnol.

Data saknas inte

Det finns sannerligen ingen brist på data om kopplingen mellan psykiatriska droger och våld, om det påstås vara anledningen till den stora tystnaden. År 2003 hade rapporter om biverkningar såsom självmord och aggressioner nått en punkt i USA där FDA inte längre kunde blunda. En hearing utfördes. Det resulterade i att FDA krävde att så gott som alla (24) antidepressiva SSRI-medel skulle ha en ”Black Box Warning”, steget innan förbud, där det varnades för våld och självmordstankar samt andra biverkningar.
http://www.cchrint.org/2012/07/20/the-aurora-colorado-tragedy-another-senseless-shooting-another-psychotropic-drug/
http://www.wnd.com/2007/07/42434/

EMEA – den europeiska läkemedelsmyndigheten – varnade år 2005 för att skriva ut antidepressiva SSRI-preparat till barn och ungdomar med depression. Myndigheten fastslog att självmordsförsök, självmordstankar och aggressivt beteende är betydligt vanligare hos barn och unga som intar SSRI-medel.
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2009/12/news_detail_000882.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

22 internationella varningar

Det har utfärdats 22 internationella varningar från sju länder för psykiatriska droger som orsakar våld, mani, fientlighet, aggressioner, psykos och andra slag av våldsreaktioner.
http://www.cchrint.org/psychiatric-drugs/drug_warnings_on_violence/

11 000 biverkningsrapporter

Bara mellan 2004 och 2012 finns det över 14 656 rapporter till FDA:s bevakningssystem om psykiatriska droger relaterade till våld. De inkluderar 300 mord, 3000 fall av mani och över 7000 fall med aggressioner. FDA säger själva att endast 1 procent av alla allvarliga fall rapporteras till dem så siffrorna är långt högre.
http://www.cchrint.org/2013/09/18/navy-yard-shooter-was-on-antidepressant-trazodone/

436 dokumenterade risker
Det finns 436 helt dokumenterade risker med antidepressiva, ADHD-droger, antipsykotika och ångestdämpande droger, vilket inkluderar studier, officiella varningar från myndigheter och biverkningsrapporter.
http://www.cchrint.org/psychiatric-drugs/

Psykiatrin vet om våldet
Inom den psykiatriska professionen är det dock känt att psykiatriska droger orsakar våld, men det är inget man talar högt om, förutom ett fåtal modiga ”kättare”.

”Våld och annat potentiellt kriminellt beteende som orsakas av receptbelagda droger är medicinens bäst bevarade hemlighet,” säger dr David Healy, världskänd psykiatriker och forskare som har skrivit och publicerat utförligt om bristen på data inom den evidensbaserade medicinen, väl beskriven i hans senaste bok, *Pharmageddon*.
Kan receptbelagda droger få någon att döda? ”**Absolut**”, svarar Healy.
https://www.rxisk.org/Default.aspx

Psykiatrer Peter Breggin är en känd opponent mot sin egen professions hänsynslösa nerdrogning, han gjorde en undersökning av ett hundratal personer som begått sanslöst våld inför sin senaste bok, *Medication Madness*:

> ”Jag började se ett mönster som jag kallar medicinskt trollbindande. Tekniskt sett så kallas nya vetenskapliga begreppet *intoxication anosognosia*: att inte veta om att man är förgiftad.”

http://www.huffingtonpost.com/dr-peter-breggin/medication-madness-how-ps_b_223922.html

Barnläkaren Leif Elinder skriver i Aftonbladet (*2008-02-28)*:

> ”Ann Tracy, fil doktor i hälsovetenskap och författare till boken ’Prozac, Panacea or Pandora’, har under tio års tid studerat hur Prozac orsakar våldsamma handlingar hos personer på ett sätt som aldrig märkts innan de tog preparatet. Hon har studerat 32 mordfall där kvinnor och deras barn var inblandade. I 24 fall kunde hon visa att kvinnorna tagit Prozac eller något annat antidepressivt preparat (SSRI).”

I många sanslösa våldsdåd så har personen upphört med medicineringen, vilket av media tolkats som orsaken till våldet – att ”den underliggande sjukdomen kommit till ytan”. Vilket är en populär förklaring för att försvara medicineringen. **Men alla seriösa forskare i detta vet att allvarliga biverkningar kan uppträda då man startar, ändrar såväl som avslutar medicineringen. Det är alltså medicineringen i sig som orsakar detta. Utan mediciner inga biverkningar.**

Psykdroger bakom självmorden
Våldet riktar sig även åt andra håll. Psykofarmaka kan ligga bakom så mycket som 86% av alla självmord. KMR i Sverige har tagit del av och publicerat en studie på alla Lex Maria anmälningar på självmord i samband med vårdkontakt under ett helt år. Hela 86 procent av alla självmord hade föregåtts av intag av någon form av psykofarmaka, 77 procent hade använt antidepressiva medel och/eller antipsykotika. Siffrorna har bekräftats av socialstyrelsen.
http://jannel.se/psyksuicid2007.pdf

En annan undersökning visade att deprimerade barn och ungdomar löpte 15 gånger större risk att *lyckas begå* självmord om de fick antidepressiva medel jämfört med obehandlade (*Archives of General Psychiatry*, 2006;63:865-72).

Äldre som förskrivs antidepressiva löper fem gånger större risk att begå självmord enligt en kanadensisk undersökning. I Finland gjordes en undersökning på 15 390 personer som fått antidepressiva medel. Den ökande risken för självmordsförsök var 39%. (Archives of General Psychiatry, 2006)

Dr David Haley skrev i British Medical Journal (BMJ 02-2005) om sambandet mellan självmord, Prozac och andra SSRI-preparat. I en intervju i tidningen Philadelphia Independent år 2004 hade han sagt:

> ”Dessa droger kan ha varit ansvariga för ett dödsfall varje dag sedan Prozac släpptes på marknaden i USA”.

Det återspeglar sig i självmordsstatistiken. Användningen av antidepressiva har fördubblats sedan år 2000 och 27 miljoner amerikaner använder dem 2010, 10 procent av befolningen. Självmord har ökat 5 procent under samma tid, men hela 16 procent bland medelålders, den grupp som främst använder dem. Det är en lögn att antidepressiva medel förhindrar självmord.
http://www.cchrint.org/tag/cho-seung-hui/

Ej våldsamma före behandlingen
KMR i USA (Citizens Commission on Human Rights - CCHR) gjorde redan i slutet av 1980-talet en internationell undersökning på slumpvist utvalda våldsdåd under en trettonårsperiod. 255 personer undersöktes. **Alla** hade fått psykiatrisk behandling. ***76 procent av dessa 255, alltså 194 personer, hade ingen våldshistoria före den psykiatriska behandlingen***. Resultatet av den psykiatriska vården var skrämmande: 780 oskyldiga offer blev utsatta för 410 mord, 47 sexövergrepp, 218 blev skjutna, knivhuggna eller fick annan skada. 60 blev utsatta för rån eller kidnappning och 45 begick självmord. Man kan lätt dra slutsatsen att psykiatriska droger framkallar våld.

Det är många kända människor som blivit offer för det besinnings-

lösa våldet: John Lennon, president Reagan, Sharon Tate (Charles Manson hade fått omfattande psykiatrisk behandling innan), prinsessan Anne, Kung Feisal av Saudiarabien, Martin Luther King, John F Kennedy och hans bror Robert Kennedy, är bara några som mördats eller skjutits av personer som fått psykiatrisk behandling innan - men ej varit våldsamma före detta. Gerald Ford likaså. ”Den galne kronprinsen” Dipendra från Nepal sköt ihjäl sina föräldrar och sju andra ur den kungliga familjen, efter han började med antidepressiva. Och även om Christer Pettersson blev frikänd av en enig domstol för mordet på Palme så hade han mördat förut - och att han blev verkligt våldsam efter den psykiatriska behandlingen - ”Från och med nu börjar han sätta skräck i Stockholms undre värld. En rad händelser vittnar om detta,” skriver Aftonbladet.

Lagstiftning drabbar fel människor

Det blir människor med psykiska besvär som får lida för psykiatrins närmast kriminella inkompetens. Det är ytterst få människor med psykiska besvär som är våldsamma – tills de får psykiatrisk behandling.

I Storbritannien har mängden av sanslösa mord begångna av psykpatienter lett till en dramatiskt strängare lagstiftning. Regeringen tillsatte en undersökning av 35 mord som skedde mellan januari 1997 och april 1998. Samtliga hade begåtts av personer som fått psykiatrisk vård. Man fann i samtliga fall utom två katastrofala brister i den psykiatriska vården, vilka i många fall ledde till morden. I rapporten står det att ”omkring vart tredje fall betraktades som förutsägbart eller möjligt att förhindra. Regeringen föreslog på grundval av denna undersökning en markant striktare lagstiftning för mentalt sjuka för att skydda allmänheten. En lagstiftning som fick stor kritik därför att den drabbade alla med psykiska besvär. Man menade att man istället skulle åtgärda psykiatrin som faktiskt var orsak till de här katastroferna genom sin uppenbara försumlighet.

Politiker biter sig i svansen när de förespråkar strängare lagstiftning och mer restriktioner. Personer med mentala besvär är inte våldsbenägna, detta är ett känt faktum bland forskare. Av dem som blivit våldsamma har majoriteten fått psykiatrisk behandling innan. http://breggin.com/index.php?option=com_content&task=view&id=299&Itemid=133

Att satsa på mer psykiatri och mer psykiatriska droger är som att hälla bensin på elden. Psykiatriker Peter Breggin skriver:

> ”I alltför många fall så orsakar eller bidrar [drogerna] till de fruktansvärda våldshändelserna. Psykiatrin är orsak och inte en kur för massvåld, och att söka efter hjälp från psykiatrin kommer enbart att distrahera oss från att söka genuint effektiva lösningar.” http://www.variety.com/2013/01/18/breggin/

Krav på undersökning

Vad som saknas är en öppen och seriös undersökning och diskussion om inverkan av psykiatrins droger på individer och samhällets välbefinnande. Efter den senaste skolskjutningen av Adam Lanza i Newtown har ett flertal instanser krävt att undersökningar måste göras av kopplingen mellan psykiatriska droger och sanslöst våld. Bland andra advokatgruppen PsychRights. I ett brev riktat till vice presidenten skriver de 2013:

> ”Den genomgripande användningen av psykiatriska droger, vilket är stöttepelaren i mentalhälsobehandling, ökar snarare än minskar extremt våld.”

De bifogar ett brev från International Society for Ethical Psychology & Psychiatry (ISEPP) som skriver:

> ”Vi begär en undersökning av sambandet mellan dessa massmord och användningen av psykotropa droger… sambandet mellan psykotropa droger och mord är inte tillfälligt … alla klasser av psykiatriska droger kan framkalla våldsamt, irrationellt och/eller maniskt beteende.”

http://psychrights.org/2013/130107Ltr2BidenGunViolenceTaskForce.pdf (sid 6)

Ett försök gjordes i New York år 2001. Då introducerades Bill (lagförslag) 1784 av senator Owen H. Johnson där det skulle införas krav på att polisen skulle samla ihop data på vissa våldsbrott och om förövaren gått på någon form av psykdrog. Lagförslaget stoppades symboliskt nog i Finance Committee (två gånger).

Big Pharma har starkt inflytande och det är ett stort problem.

http://www.cchrint.org/nybillpsychiatricdruguse/

Det behövs en oberoende och seriös undersökning och diskussion om mentalhälsoindustrins inverkan på samhällets välbefinnande när det gäller det sanslösa våldet, ej baserad på förutfattade meningar och finansiella intressen.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter - KMR

Kommittén för Mänskliga Rättigheter grundades 1969 i USA av Scientologi-kyrkan och psykiatriprofessor Thomas Szasz, världens mest kända psykiatrikritiker, och 1972 i Sverige, för att undersöka och avslöja övergrepp mot de mänskliga rättigheterna inom mentalhälsovården och för att reformera den psykiatriska vården.

Kontakt:
KMR, Box 6039, 129 06 Hägersten
e-mail: info.kmr@telia.com
Hemsidor: www.kmr.nu / www.mynewsdesk.se